

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ФЛАМИН
наименование лекарственного препарата

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

Регистрационный номер: ЛС-000504

Торговое название: Фламин

Группировочное название: Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов.

Лекарственная форма: гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей

Состав на одну упаковку

Активный компонент

Фламин - 0,0193 г

(Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов)

с содержанием суммы флавоноидов в пересчете

на изосалипурлозид и сухое вещество 60,0%

Вспомогательные вещества

Пектин - 0,07500 г

Лимонной кислоты моногидрат - 0,00750 г

Сорбиновая кислота - 0,00375 г

Сахар (сахароза) - 1,27445 г

Масса гранул в упаковке - 1,3800 г

Описание

Гранулы в виде крупинок неправильной формы от светло-желтого до серовато-желтого цвета без запаха или со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ

[A05AX]

Фармакологические свойства

Средство растительного происхождения; оказывает желчегонное, холекинетическое, холеретическое, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие. Усиливает секрецию желчи и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи. Стимулирует выделение желудочного сока и, замедляя эвакуаторную функцию желудка и кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы, расширяет кровеносные сосуды кишечника.

Способствуя выделению холестерина с желчью, оказывает гипохолестеринемическое действие; обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению

Гепатит, хронической гепатохолецистит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, дефицит сахарозы/изомальтазы, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 1 месяца.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

С осторожностью

Больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, больным артериальной гипертензией.

Способ применения и дозы

Детям от 1 месяца до 12 лет, внутрь, в виде суспензии, 3 раза в день за 30 минут до еды. Для приготовления суспензии к содержимому пакета (1,38 г) добавляют 1,5 чайных ложки (7,5 мл) свежeproкипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды и перемешивают до получения однородной суспензии. Перед применением суспензию взбалтывают. Срок хранения готовой суспензии не более 10 дней

Препарат назначают в зависимости от возраста:

От 1 месяца до 1 года – по 1 пакету в сутки;

От 1 года до 3 лет – по 2 пакета в сутки;

От 4 до 5 лет – по 3 пакета в сутки;

От 5 до 12 лет – по 4 пакета в сутки; Длительность лечения - 10 -40 дней.

Повторные курсы возможны по согласованию с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, повышение артериального давления (у больных артериальной гипертензией).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Повышает активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

Особые указания

Для больных сахарным диабетом: необходимо учитывать, что в одном пакете препарата содержится около 1.3 г углеводов (0,11XE).

Форма выпуска

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь для детей.

По 1,38 г в пакете из бумаги с полиэтиленовым покрытием (бумага ламинированная).

10 или 20 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии

ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск. ГНЦ ПМ.

Тел/факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.